

Elvytetyn potilaan ennustemuuttujat		Levy, Bates, Caronna et al. 1981	Booth et al. 2004	American Academy of Neurology 2006
Aivorunkoheijasteet	Mustuaisen valoheijaste	Aivorunkoheijasteet puuttuvat kolmen vuorokauden kohdalla - hyvän toipumisen mahdollisuus 0%	Puuttuva mustuaisen valoheijaste - tärkein huonon ennusteen merkki 24 tunnin kohdalla	Mustuaisen valoheijaste puuttuu kolmen vuorokauden kohdalla - ennuste huono (virhearvion riski 0%)
	Korneaheijaste		Puuttuva korneaheijaste - toiseksi tärkein huonon ennusteen merkki 24 tunnin kohdalla	Korneaheijaste puuttuu kolmen vuorokauden kohdalla - ennuste huono (virhearvion riski 0%)
Motorinen vaste	Parhaimmillaan väistö	Väistö kolmen vuorokauden kohdalla - hyvän toipumisen mahdollisuus 33%		
	Parhaimmillaan fleksio	Fleksio, ekstensio tai puuttuu kolmen vuorokauden kohdalla - hyvän toipumisen mahdollisuus 8%		
	Parhaimmillaan ekstensio			Fleksio kolmen vuorokauden kohdalla - ennuste huono (virhearvion riski 0%)
	Ei liikettä		Puuttuva motorinen vaste - tärkein huonon ennusteen merkki 72 tunnin kohdalla	Puuttuva motorinen vaste kolmen vuorokauden kohdalla - ennuste huono (virhearvion riski 0%)
Puhe	Puhevaste	Sanoja kolmen vuorokauden kohdalla - hyvän toipumisen mahdollisuus 74%		
Neurofysiologia	SEP-vaste			Puuttuva SEP-vaste 1 - 3 vuorokauden kohdalla - ennuste huono (virhearvion riski 0.7%)
Laboratorio	NSE			NSE >33 ug/l 1 - 3 vuorokauden kohdalla - ennuste huono (virhearvion riski 0%)
EEG	Myokloninen Status Epilepticus			Myokloninen status ensimmäisen vuorokauden aikana - ennuste huono (virhearvion riski 0%)

SEP = Somatosensory Evoked Potentials, NSE = Neuron Spesific Enolase, EEG = Electroencephalography - Huom! Hypotermiahoito vaikuttaa taulukon ennustemuuttujiin